

Contrôle hivernal pour jeunes veaux



VÉRIFICATION DES VEAUX – ÉDITION HIVER

(Imprimer et afficher dans la salle de vêlage ou près des niches à veaux)

Juste après la naissance

- Dans les 2 heures : 3–4 litres de colostrum de haute qualité.
- Vérifier la qualité du colostrum avec un réfractomètre (valeur Brix).
- Bien sécher le veau et le placer dans un environnement sec, sans courant d'air.

Hébergement et litière

- Ajouter de la litière supplémentaire pour la chaleur et le confort. Une couche épaisse et sèche de paille. Le veau doit pouvoir “s'enfourir” dans la paille.
- Assurer un logement sec et sans courant d'air. Aucun courant d'air ou vent direct sur la tête ou le cou du veau.
- Vérifier quotidiennement l'humidité ou les zones mouillées de l'aire de repos.
- Retirer la paille humide et la remplacer si nécessaire.
- Vérifier chaque jour que la ventilation est suffisante sans courant d'air froid.

Sol

- Vérifier que le sol reste sec et propre par temps humide.
- Utiliser une niche avec plancher si le sol est trop humide.
- Placer une couche drainante (sable, gravier) sous les niches sans plancher. Assurer une bonne pente pour que l'eau de pluie s'écoule.

Température & confort

- Gérer la température ambiante avec une alimentation adaptée, une bonne litière, des couvertures pour veaux ou des bodywarmers, et si nécessaire un chauffage infrarouge ou une lampe chauffante.
- Vérifier régulièrement les zones froides.
- Ajouter une source de chaleur pour les très jeunes veaux : lampe chauffante ou couverture/bodywarmer.

Alimentation et énergie

- Augmenter la concentration du lait pour veaux ou ajouter une tétée supplémentaire à concentration habituelle :

Plus de lait ou apport énergétique plus élevé en dessous de 10–15°C.

Moments de tétée suffisants (min. 2×/jour, idéalement 3× par temps froid).

- Fournir de l'eau propre et tiède. Un apport supplémentaire de liquide améliore la consommation du fourrage et des concentrés.

Hébergement extérieur et fortes pluies

- Donner de plus petites portions plus souvent pour garder l'aliment le plus sec possible.
- Couvrir le seau d'aliment après remplissage.
- Choisir des seaux faciles à retirer pour les sécher rapidement.
- Retirer les aliments devenus trop humides.

Protection

- Couverture ou bodywarmer pour jeunes veaux ou en cas de froid extrême.
- Vérifier régulièrement l'humidité et l'hygiène des couvertures.

Contrôle

- Surveiller les frissons, la posture voûtée, une moindre envie de téter ou l'abattement.
- Prendre la température du veau en cas de doute (moins de 38,5°C = risque).
- Veau en bonne santé = actif, nez sec, yeux vifs, pelage lisse, brillant et propre, oreilles droites et chaudes.
- Installer un thermomètre min/max près des veaux. Par basses températures, les veaux ont besoin de plus d'énergie ; ajuster la concentration ou le nombre de repas lactés.

